

GUÍA DE INFORMACIÓN TÉCNICA



GUÍA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

FOSTONIC 80% WP



FOSTONIC™ 80% WP

(FOSETIL-ALUMINIO 80% WP)



GUÍA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

FOSTONIC 80% WP

FOSTONIC™ es una marca registrada de Agriphar S.A.
FOSTONIC™ 80% WP es fabricado por Agriphar S.A. en Bélgica

1. Espectro Biológico

Fosetil-aluminio es un fungicida sistémico, absorbido rápidamente a través de las hojas o raíces de las plantas, con translocación tanto acropetalmente como basipetalmente. El control de las enfermedades causadas por Phycomycetes (*Phytophthora*, *Pythium*, *Plasmopara*, *Bremia* sp,..)

2. Método de aplicación

Asegúrese de que el pulverizador u otro aplicador este limpio y fijado para dar el volumen e incluso un depósito correcto. Llene el pulverizador o un recipiente con agua hasta la mitad y luego añada la cantidad recomendada de FOSTONIC™. Añadir el resto de agua y agitar completamente la mezcla. El producto diluido debe ser utilizado únicamente en el día de la mezcla.

3. Usos y rangos de aplicación

CULTIVOS	PLAGAS	RANGOS DE APLICACIONES	TIEMPO DE APLICACION
Aguacates	<i>Pudrición de Raíz y cuello</i> (<i>Phytophthora</i> sp.)	4 g/l aplicar 15 a 20 lts	Aplicación foliar en la parte inferior del tallo, cada 2 meses.

GUÍA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

FOSTONIC 80% WP

Piña	Pudrición del Corazón (<i>Phytophthora parasitica</i>)	2.5 g/l	Siembra de Material por inmersión en una concentración de 2.5 g/l, seguido de la aplicación foliar a partir del 6to. mes después de la siembra y luego a intervalos de 3 meses a la concentración de la solución. Repita la pulverización foliar después de 4 meses con una solución de 2.5 g/l a un volumen de agua alto.
Cítricos	Cancro Pulverizador	2.5 gm/l Asegurando una buena cobertura	Aplicación foliar cada 3 meses
Plantas Ornamentales	<i>Phytophthora sp.</i>	10 g/m ²	Aplicación al suelo
Cebollas	Muldiu Velloso (<i>Pseudoperonospora destructor</i>)	3 kg/ha	Pulverizar cultivo. Tratamiento dos veces al mes.
Cucurbitáceas	Muldiu Velloso (<i>Pseudoperonospora cubensis</i>)	Igual como las cebollas	
Lechuga	Muldiu Velloso (<i>Bremia lactucea</i>)	Tratar el suelo con una concentración de 50 gm/m ² o pulverización con una concentración de 2.5 g/l del nacimiento en adelante	
Fresa	alma roja de la raíz de la fresa	3.0 g/l	Aplicar el producto cuando el hongo se encuentre en una etapa de desarrollo
Frutales de Hueso	Fuego bacteriano (<i>Erwinia amylovora</i>)	3.75 g/l	Aplicar el producto como un tratamiento preventivo o curativo.
Gomosis	Cortar las zonas afectadas, eliminando también un margen de 2 cm de la corteza sana. Pintar la herida con una solución de 100-250 gm/l		

4. Medidas de Seguridad

Tomar en cuenta las normas generales para la manipulación de productos químicos de protección de cultivos:

- Manténgase fuera del alcance de los niños,
- Cuando lo utilice, no comer, beber o fumar.
- Mantener lejos de alimentos, bebidas y alimentos para animales
- Lavar las manos y la piel expuesta antes de comer, beber o fumar; antes de las comidas y después del trabajo.
- En caso de malestar, acuda al médico (mostrar la etiqueta siempre que sea posible).
- Conservar el producto en el envase original, bien cerrado, en un lugar fresco y bien ventilado, protegido del calor, lejos de alimentos o alimentos para animales
- No re-utilizar el envase para ningún otro propósito, por el contrario destruya el recipiente enjugado, perforándolo y aplastándolo.

5. Primeros Auxilios

- **En caso de inhalación:** trasladar al afectado al aire libre. Si el afectado no respira, administrar respiración artificial. Si la administración de oxígeno es necesario. Obtenga atención médica

GUÍA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

FOSTONIC 80% WP

- **En caso de ingesta:** No provocar el vómito. No administrar nada oralmente. Obtenga atención médica inmediatamente.
- **En caso de contacto con la piel:** Retirar la ropa contaminada inmediatamente. Lavar la contaminación de la piel con abundante jabón y agua. Lavar la ropa por separado antes de re-utilizarla. Consultar con un médico si el dolor persiste.
- **En caso de contacto con los ojos:** lavar inmediatamente con abundante agua manteniendo el párpado bien abierto (por lo menos 20 minutos).