

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



TRUSTCHEM ATRAZINA 90 WG

HERBICIDA - TRIAZINA
ATRAZINA

ATENCIÓN

ANTIDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.




USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: TRUSTCHEM ATRAZINA 90 WG es un herbicida sistémico que es absorbido por las hojas y las raíces de las malezas impidiendo su desarrollo al inhibir el proceso fotosintético, pero permite que los cultivos continúen creciendo debido al mejor aprovechamiento de los nutrientes del suelo, agua y luz solar. Puede ser aplicado en pre y post-emergencia del cultivo y en pre o post-emergencia temprana de las malezas.

EQUIPO DE APLICACIÓN: TRUSTCHEM ATRAZINA 90 WG se aplica con equipo terrestre. Para las aplicaciones terrestres debe usarse boquillas adecuadas para la aplicación. Asegúrese que las boquillas sean del mismo de tamaño y que queden bien espaciadas. Si va a utilizar bomba de presión, mantenga la presión entre 30-40 psi para aplicaciones pre-emergentes y entre 20-25 psi para las aplicaciones post-emergentes. Antes y después de ser usado el equipo de aplicación debe ser lavado con suficiente agua y jabón. Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección: guantes y botas de hule, gafas y mascarilla, overol y sombrero.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, OVEROL, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE. NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Al preparar la mezcla, llene el tanque a la mitad con agua y vierta la dosis completa de TRUSTCHEM ATRAZINA 90 WG que va a utilizar y mézclelo; posteriormente complete el agua a utilizar. Si utiliza el producto mezclado con otros pesticidas, haga premezclas por separado y luego vierta al tanque la premezcla. Para dosificar la cantidad correcta, debe utilizar un tazón medidor. Agitar continuamente la mezcla para mantener el material en suspensión.

Antes y después de ser usado el equipo de aplicación y los utensilios usados en la mezcla deben ser lavados con suficiente agua y jabón.

Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección: guantes y botas de hule, gafas, mascarilla, overol y sombrero.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS Y MOMENTO DE APLICACION
Maíz (<i>Zea mays</i>)	MALEZAS DE HOJA ANCHA: Bledo (<i>Amaranthus</i> spp) Cenizo (<i>Chenopodium album</i>) Batatilla (<i>Ipomoea</i> spp.) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Escoba (<i>Sida</i> spp)	1.5 - 2.6 Kg/ha Pre-emergencia: Hacer una única aplicación, al área total o en banda, después de sembrado el maíz antes de que emerja. Pre- siembra incorporado: Sembrar el maíz por lo menos a 2 pulgadas de profundidad. En post-emergencia: Cuando las malezas no tengan más de 2-3 hojas.
Sorgo (<i>Sorghum vulgare</i>)	Lengua de vaca (<i>Rumex crispus</i>) Manzanilla (<i>Anthemis cotula</i>) Mastuerzo (<i>Coronopus didymus</i>) Nabo (<i>Brassica campestris</i>) Ortiga (<i>Urtica urens</i>)	1.3 - 2.3 Kg/ha Pre-emergencia: Hacer una única aplicación, al área total o en banda, después de sembrado el sorgo antes de que emerja. Pre- siembra incorporado: 2-3 semanas antes de la siembra y sembrar el sorgo por lo menos a 2 pulgadas de profundidad. En post-emergencia: Cuando las malezas no tengan más de 2-3 hojas.
Caña de Azúcar (<i>Saccharum officinarum</i>)	Revienta caballos (<i>Solanum elaeagnifolium</i>) Sanguinaria yerba de burro (<i>Polygonum</i> spp)	1.8 - 3.0 Kg/ha En Pre-emergencia: de la Caña de azúcar En post-emergencia: Cuando las malezas no tengan más de 2-3 hojas
Piña (<i>Ananas comosus</i>) Cítricos (<i>Citrus spp</i>)	Veronica (<i>Veronica arvensis</i>) Zapattillo amargo (<i>Cucurbita andreana</i>) Yerba lechera (<i>Euphorbia</i> spp)	2.0 - 3.0 Kg/ha En Pre-siembra o inmediatamente después de la siembra.
Guayaba (<i>Psidium guajava</i>)	Malva cimarrona (<i>Anoda cristata</i>) MALEZAS GRAMINEAS: Gramínea dulce (<i>Paspalum distichum</i>) Rabo de gato (<i>Setaria</i> spp)	2.0 - 3.0 Kg/ha En Pre-emergencia de la maleza En post-emergencia: Cuando las malezas no tengan más de 2-3 hojas Aplicar en plantaciones de 18 meses de edad en adelante. Repetir la aplicación cuando sea necesario pero no aplicar más de 8.8 libras por año.
Macadamia (<i>Macadamia spp</i>)	Arrocillo (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Pata de gallina (<i>Eleusine indica</i>) Pasto de invierno (<i>Poa annua</i>)	2.0 - 3.0 Kg/ha En Pre-emergencia de la maleza En post-emergencia: Cuando las malezas no tengan más de 2-3 hojas Repetir la aplicación cuando sea necesario pero no aplicar más de 8.8 libras por año. No aplicar en época de cosecha.
Césped	Arrocillo (<i>Echinochloa colonum</i>)	1.3 - 2.3 Kg/ha En Pre-emergencia de la maleza En post-emergencia: Cuando las malezas no tengan más de 2-3 hojas No aplicar en campo de golf.
Forestal, vía férreas		2.0 - 3.5 Kg/ha En Pre-emergencia: de la maleza En post-emergencia: Cuando las malezas no tengan más de 2-3 hojas aplicar una sola vez por año.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No es necesario dejar intervalos, las aplicaciones son al inicio del ciclo del cultivo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA:

Esperar a que haya secado el rocío de la aspersión. Si fuere necesario ingresar antes, utilice equipo de protección personal completo: sombrero, gafas protectoras, mascarillas, overol, guantes y botas de hule.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico si se usa en la forma y dosis recomendadas. Ciertas variedades de caña pueden mostrar clorosis inicial, que luego desaparece.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los pesticidas, pero siempre es conveniente hacer pruebas de compatibilidad antes de mezclarlo con otro producto.

PH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA MEZCLA: 6.0

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo use los accesorios de protección completos: sombrero, gafas, mascarillas, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de aspersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, ropa o forrajes; no almacenar en casas de habitación. Guarde y transporte el producto en un lugar seco, ventilado, lejos de fertilizantes, semillas, otros agroquímicos o insumo de uso humano y animal. Conserve el producto en su envase original bien cerrado.

SINTOMAS DE INTOXICACION: La sobreexposición a los herbicidas de la triazina puede inducir fatiga, vértigos, náusea, vómitos, diarrea, convulsiones, irritación de la piel, los ojos y zona respiratoria, eczema alérgica o asma.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO MEDICO: No tiene antídoto. El tratamiento es sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
C/Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo.
TEL.: 809-332-6666

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo.
TEL.: 809-681-7828

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:



TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben perforarse y depositarse en los centros de acopio o recolección, autorizados por el Ministerio de Agricultura.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y la calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en envases originales cerrados. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones de este panfleto han demostrado ser eficiente para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

Exportado por:
TRUSTCHEM CO., LTD.
D2, 23 RD floor, Golden Eagle
International plaza, 89 Hanzhong
Road 210029 Nanjing, China

Fabricado por:
**ZHEJIANG ZHONGSHAN
CHEMICAL INDUSTRY
GROUP CO., LTD.**
Zhogshan, Xiaopu, Changxing
Zhejiang, China

Importador y Registrante:

J.A. GARCIA, S.R.L.

C/ Rafael Pérez #54, Los Tocones, El Ingenio Arriba, Santiago, República Dominicana Tel.: 809-575-1323 1-809-200-0092 (Sin cargo) Email: info@jagarcia.com.do Website: www.jagarcia.com.do

PAIS	No. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Rep. Dominicana	4916	21 / 09 / 2015