

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS



HAF-PYNT 72 SL

HERBICIDA - FENOXIACETICO
2,4 - D DIMETIL AMINA



PELIGRO

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.12 g/ml

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION: HAF-PYNT 72 SL es un herbicida hormonal selectivo de acción post-emergente que combate malezas de hoja ancha. Es absorbido por las hojas y la raíz de las plantas tratadas, se mueve a través del floema y xilema ejerciendo su acción herbicida sobre los ácidos nucleicos de la planta. Actúa causando una división descontrolada de las células en el tejido vascular. Aumentos anormales en la plasticidad de las paredes de las células, biosíntesis de proteínas y producción de etileno ocurre en los tejidos de las plantas luego de la exposición y estos procesos son los responsables de la división descontrolada.

EQUIPO DE APLICACION: Recomendamos las aplicaciones con equipos terrestre, bombas de mochila manual o motorizada, bombas estacionarias o acoplada a tractor. Con excepción de zonas de monocultivos de gramíneas, recomendamos evitar las aplicaciones áreas por las consecuencias negativas de las derivas sobre cultivos de hoja ancha colindantes. Previo a su uso verifique que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado, limpio y calibrado. Después de usar el equipo de aplicación debe ser lavado con suficiente agua y jabón. Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección personal: guantes y botas de hule, gafas, mascarilla, overol, sombrero, dosificador y aplicador.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas y paleta de agitación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. Debe usar el equipo de protección personal: guantes y botas de hule, mascarilla y gafas, overol y sombrero durante el lavado del equipo de aplicación, preparación de la mezcla y aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

MALEZAS QUE CONTROLA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Alfiler	Bidens pilosa
Batallilla	Ipomoea spp.
Bledo	Amaranthus spp.
Botoncillo	Eclipta alba
Bruca	Cassia spp.
Cenizo	Chenopodium album
Clavito	Ludwigia erecta
Coquillo	Cyperus spp.
Diente de león	Taraxacum officinale
Escoba	Sida acuta
Escoba dulce	Caperonia palustris
Hierba amarga	Parthenium hysterophorus
Hierba de chivo	Ageratum conyzoides
Losey	Rumex crispus
Malva	Malva spp.
Moriviví	Mimosa pudica
Suelda con suelda	Commelina diffusa
Tabaquillo	Cleome viscosa
Tamarindillo	Aeschynomene spp.
Tostón	Boerhavia erecta
Verdolaga	Portulaca oleracea
Yerba lechera	Euphorbia heterophylla

CULTIVOS	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Arroz	Oryza sativa
Café	Coffea arábica
Caña de azúcar	Saccharum officinarum
Maíz	Zea mays
Sorgo	Sorghum vulgare
Áreas no cultivadas Campos de Golf Otras Gramíneas Pastos y Césped	

DOSIS RECOMENDADAS: Usar de 1.5 - 3.0 litros por hectárea.

PH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA DILUCION: 7.0

INTERVALO DE APLICACION: En Arroz, aplique antes del macollamiento. En Caña de azúcar aplique sobre la maleza en su estado inicial de desarrollo (menos de 5 cm de altura). En Maíz aplique en post emergencia dirigida, cuando el Maíz tenga de 20 cm de altura. En Sorgo aplique cuando la planta de sorgo tenga una altura de 15 a 25 cm y la maleza no menos de 5 cm. En Pastos aplique en la primavera o en el otoño; en Pastizales nuevos después de que el pasto haya macollado.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 30 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Espere que el rocío de la aplicación haya secado. En Pastos esperar 14 días para el reingreso del ganado.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico usándolo a la dosis y forma de uso recomendado. Deben evitarse las derivas a los cultivos vecinos, sobre todo si son de hojas anchas.

COMPATIBILIDAD: HAF-PYNT 72 SL, es compatible con la mayoría de los agroquímicos comunes del mercado. No es compatible con productos alcalinos, al usar en mezcla se requiere hacer prueba de compatibilidad.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Durante el manejo de la mezcla, aplicación y lavado del equipo use los accesorios de protección personal: sombrero, gafas, mascarilla, overol, guantes y botas de hule. Lave el equipo de aplicación y protección después de cada jornada de trabajo. No lave la ropa de protección junto con la ropa de uso normal. Evite el contacto directo con el producto y respirar la llovizna de dispersión.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes ni semillas. Almacéne y transpórtelo en su envase original, en lugar seco y ventilado y lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapaces. Maneje el producto cuidadosamente para evitar derrames. Si el derrame ocurre, cúbralo con aserrín o arena y deposite los residuos en el centro más cercano autorizado para esos fines por el Ministerio de Agricultura.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, OVEROL, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Irritación de los ojos con daños en la cornea, náusea, vómitos, dolores abdominales y sudoración.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).

C/Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo, D.N.

TEL.: 809-332-6666

Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.

Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo, D.N.

TEL.: 809-681-7828

PROTECCION AL AMBIENTE:



TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS:



TOXICO PARA ABEJAS:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCAN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "triple lavado", perforarlos y depositarlos en un centro de acopio autorizado por las autoridades. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser depositados en el centro más cercano autorizado para esos fines por el Ministerio de Agricultura.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en su envase original y con el sello de garantía inalterado. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones del panfleto han demostrado ser eficientes para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

Formulado y Exportado por:

AGROW ALLIED VENTURES PVT. LTD.

C 1/9 DLF Phase-1, Gurgaon, 122002,

Haryana, India.

Importador y Registrante:

J. A. GARCIA, S. R. L.

C/Rafael Pérez # 54, Los Tocones, El Ingenio Arriba, Santiago,

Rep. Dominicana. Tel: 809-575-1323/1-809-200-0092 (sin cargo).

E-mail: info@jagarcia.com.do Website: www.jagarcia.com.do

PAIS

Rep. Dominicana

NO. DE REGISTRO

8032

FECHA DE REGISTRO

25 / 02 / 2021