¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

BESTSELLER 10 EC

INSECTICIDA – PIRETROIDE
ALFACIPERMETRINA

!

ATENCION

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1.12 gr./cc a 20ºC.
SOLVENTE: XILENO

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONOMICO

MODO DE ACCION: BESTSELLER 10 EC, es un insecticida piretroide que actúa por contacto. Es efectivo contra una gran gama de insectos masticadores y chupadores que causan daños en una gran variedad de cultivos.

EQUIPO DE APLICACION: BESTSELLER 10 EC, puede ser aplicado con cualquier equipo, ya sea terrestre o aéreo. Antes de utilizar el equipo de aspersión revise que esté en buen estado de funcionamiento. Antes de usar BESTSELLER 10 EC, calibre con agua el equipo de aspersión, para verificar que está aplicándola dosis correcta. Después de la aplicación lave el equipo de protección y el equipo de aplicación.

FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Al preparar la mezcla, llene el tanque a la mitad con agua y vierta la Dosis completa de BESTSELLER 10 EC que va a utilizar y mézclelo Posteriormente complete el agua a utilizar. Si utiliza BESTSELLER 10 EC mezclado con otros pesticidas, haga pre-mezclas por separado y luego vierta al tanque la premezcla. Para dosificarla cantidad correcta de acuerdo con el tanque de la asperjadora, puede utilizar un tazón medidor o copa de medida. Debe usar se el equipo De protección recomendado: Botas de goma, mascarilla, anteojos protectores, guantes de goma, dosificador y aplicador.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	PLAGAS	DOSIS
Tabaco **Nicotiana tabacum**	Gusano cogollero (**Heliothis spp**), Oruga verde (**Manduca sexta**), Falso medidor (**Trichoplusia ni**), Candelilla (**Phthorimaea operculella**), Tierrero (**Agrotis spp**), Trips (**Thrips tabaci**), Miridos (**Dicyphus minimus**), Mosca Blanca (**Bemisia tabaci**), Afidos (**Myzus persicae**).	70 - 100 cc en 50 gls. de agua para 8 tareas
Arroz **Oryza sativa**	Gusanos cogolleros (**Spodoptera frugiperda** y **Heliothis zea**), Gusano enrollador (**Panoquina nyctella**), Taladradores (**Diatraea saccharalis** y **Chilo suppresalis**), Chinches del Arroz (**Oebalus ssp.** y **Lectocorisavari cornis**), Chicharrita (**Empoasca spp**), Sogata (**Sogata oryzicola**), Mosquita minadora del Arroz (**Hydrellia griseola**).	50 - 60 cc en 50 gls. de agua para 7 tareas. Aplicación Aérea: 500 - 700 cc por vuelo de 100 tareas.
CUCURBITACEAS: Melón **Cucumis melo** Sandía **Citrullus vulgaris** Pepino **Cucumis sativus**	Chicharrita (**Empoasca spp**), Mosca Blanca (**Bemisia tabaci**), Pulgón del Melón (**Aphis gossypii**), Minador de la hoja (**Liriomyza spp**), Trips (**Thrips tabaci**), Gusano del fruto (**Heliothis spp**), Gusano taladrador (**Diaphania spp**), Falso medidor (**Trichoplusia ni**).	60-80 cc en 50 gls. de agua para 7 tareas
FRUTALES: Cítricos **Citrus spp.** Mango **Manguifera indica** Piña **Ananas comosus** Lechosa **Carica papaya** Aguacate **Persea americana**	Afidos del Naranjo (**Toxoptera aurantii**), Mosca Blanca (**Alerothrixusfloccosus**, **Alerocanthus woglumi**), Saltadores del Mango (**Idiocerus spp**), Trips (**Scirtothrips aurantii**), Chicharrita (**Empoasca spp**), Escama (**Pseudococcus spp**), Mosca de la Fruta (**Anastrepha spp**), Cochinilla Acanalada (**Icerya purchasi**), Escama Marrón (**Lepidosa phesbeckii**), Chinche de Encaje (**Pseudoacysta persea**).	60-80cc en 50 gls.de agua para 7 tareas
HORTALIZAS: Aji **Capsicum annuum** Tomate **Solanum lycopersicum** Cebolla **Allium cepa** Papa **Solanum Tuberosum** Zanahoria **Daucus carota**	Pulgón (**Myzus persicae**), Trips (**Thrips tabaci**), Minador de la hoja (**Liriomyza spp**), Mosca Blanca (**Dialeurodes spp**), Hiede vivo (**Nezara viridula**), Falso medidor (**Trichoplusia ni**), Gusano Constancero (**Spodoptera exigua**), Mosca Blanca **Bemisia Tabaci**), Mosquito verde (**Empoasca spp**),	70 - 125 cc en agua para 8 tareas.
LEGUMINOSAS: Arveja **Pisum sativum** Habichuela **Phaseolus vulgaris** Soya **Glycine max**	Hiede vivo (**Nezara viridula**), Mosca Blanca (**Bemisia tabaci**), Afidos (**Myzus spp**), Saltahojas (**Empoasca kraemeri**), Minador de la hoja (**Liriomyza spp**), Gusano de la vaina (**Heliothis spp**), Pega hoja (**Urbanus proteus**).	70 - 100 cc en 50 gls. de agua para 8 tareas.
Café **Coffea arábica**	Escama Verde (**Coccus viridis**), Minador del Café (**Leucoptera coffeella**), Mosca de la fruta (**Ceratitis spp**), Cochinilla harinosa (**Pseudococcus spp**), Broca del café (**Hypotenemus hampei**).	50-60 Kg./ha. 4-5.5 Lbs./ta.
Maíz **Zea mays** Sorgo **Sorghum bicolor**	Gusano cogollero (**Spodoptera frugiperda**), Gusano del fruto (**Heliothis spp**), Falso medidor (**Trichoplusia ni**), Gusano cuerudo (**Agrotis spp**), Afido del Maíz (**Rhopalosi phummaidis**), Chicharrita del Maíz (**Baldulus maidis**), Mosquita del sorgo (**Contarinia sorghicola**), Chinche (**Blissus spp**).	75-100 Kg./ha. 5.5-7 Lbs./ta.
Piña **Anana comosus**	Cochinilla harinosa (**Dysmicoccus brevipes**, **Planococcus spp**), Trips (**Holothrips ananas**).	50-60Kg./ha. 5.5-7 Lbs.

PH IDEAL PARA LA MEZCLA: 5.0

INTERVALO DE APLICACION: Las aplicaciones deben realizarse, según la presencia de la plaga y los muestreos realizados.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 21 días para todos los cultivos.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Esperar 2 horas después de la aplicación, para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: Usado a las dosis recomendada BESTSELLER 10 EC, no es fitotóxico a los cultivos.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los pesticidas de uso corriente, excepto los de fuerte reacción alcalina. Este producto es compatible con PROPANIL en el cultivo de arroz.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene este producto con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes ni semillas. Almacénese y transpórtese en su envase original, en lugar seco y ventilado y lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapaces. Maneje el producto cuidadosamente para evitar derrames. Si el derrame ocurre, cúbralo con aserrín o arena y deposite los residuos en el centro más cercano autorizado para esos fines por el Ministerio de Agricultura.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, OVEROL, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

SINTOMAS DE INTOXICACION: Desvanecimiento, dolor de cabeza, náuseas, fatiga, dolores gastrointestinales, estado de coma, hormigueo, ardor o entumecimiento. La inhalación de las pulverizaciones puede provocar irritación temporal del tracto respiratorio superior.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque ayuda médica.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga atención médica.
EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y aireado. Manténgalo en reposo. Busque ayuda médica.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: Aplicar tratamiento sintomático, no existe antídoto específico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:
Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
C/Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo, D.N.
TEL.: 809-332-6666
Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo, D.N.
TEL.: 809-681-7828

PROTECCION AL AMBIENTE:

TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS:

TOXICO PARA ABEJAS:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVOREZCEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos, deben pasar por un proceso de limpieza de ´´triple lavado´´ perforarlos y depositarlos en un centro de acopio autorizado por las autoridades del Ministerio de Agricultura. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua.

EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en su envase original y con el sello de garantía inalterado. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones del panfleto han demostrado ser eficientes para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

Fabricado y exportado por:
ARYSTA LIFE SCIENCE BENELUX SPRL. Rue de Renory 26, B-4102 Ougrée, Belgica.

Importador y Registrante:
J. A. GARCIA, S. R. L.
C/Rafael Pérez # 54, Los Tocones, El Ingenio Arriba, Santiago, Rep. Dominicana. Tel: 809-575-1323/1-809-200-0092 (sin cargo).
E-mail: info@jagarcia.com.do Website: www.jagarcia.com.do

PAIS	NO. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Rep. Dominicana	1451	30/12/1994