

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS.

DODINE 24 EC

HERBICIDA - OXIMA CICLODIONA
CLETODIM

ATENCION

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 0,96 g / cm³

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO:

MODO DE ACCION: DODINE 24 EC, es un herbicida post-emergente selectivo, sistémico para el control de gramíneas anuales y perennes. Es un inhibidor de la acetil coenzima a carboxilasa. Su acción herbicida sobre las hierbas sensibles se traduce en una rápida reducción del vigor y crecimiento, y en la aparición de clorosis y necrosis en la parte del tejido joven de las plantas; a continuación se produce un colapso progresivo en la parte foliar restante y en poco tiempo la muerte de la maleza. Se absorbe rápidamente y se trasloca fácilmente desde las hojas tratadas al sistema radical y puntos de crecimiento de la planta.

EQUIPO DE APLICACION: Se recomienda aplicar con equipo terrestre o aéreo. Previo a su uso verifique que el equipo de aplicación se encuentre en buen estado, limpio y calibrado. Después de usar el equipo de aplicación debe ser lavado con suficiente agua y jabón. Durante su manejo y aplicación utilice equipo de protección personal: guantes y botas de hule, gafas, mascarilla, overol, sombrero, dosificador y aplicador.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene el tanque de aplicación hasta la mitad de su volumen con agua, agregue la dosis recomendada del producto y agite; termine de llenar con agua limpia el tanque del equipo de aplicación y mantenga la agitación incluso durante la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar como dosificadores, cubetas graduadas y paleta de agitación. Prepare únicamente la solución que pueda ser aplicada durante el mismo día. Los utensilios y el equipo empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua y jabón después de cada jornada de trabajo. Debe usar el equipo de protección personal: guantes y botas de hule, mascarilla y gafas, overol y sombrero durante el lavado del equipo, preparación de la mezcla y aplicación.



RECOMENDACIONES DE USO:

MALEZAS QUE CONTROLA	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Amorcillo	Rottboellia exaltata
Bermuda	Cynodon dactylon
Brachiaria	Brachiaria platyphylla
Cadillo	Cenchrus echinatus
Cebada	Sorghum bicolor
Cunde conuco	Eragrostis spp
Gramma dulce	Digitaria ciliaris
Lechuga silvestre	Lactuca spp
Limpia botella	Setaria glauca
Maicillo	Sorghum sudanense
Nylon	Leptochloa spp
Pata de gallina	Eleusine indica
Pie de gallo	Echinochloa colonum
Pata de cotorra	Digitaria sanguinalis
Pajón	Panicum miliaceum
Poa	Poa annua
Tumba crédito	Leptochloa filiformis
Verdolaga	Portulaca oleracea
Yerba guinea	Panicum maximum
Yerba de hilo	Leptochloa filiformis
Yerba páez	Brachiaria mutica

CULTIVOS	
NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO
Ajo	Allium sativum
Aji	Capsicum annum
Apio	Apium graveolens
Batata	Ipomoea batata
Berenjena	Solanum melongena
Brocoli	Brassica oleracea var. Itálica
Bangaña	Lagenaria vulgaris
Coliflor	Brassica oleracea var.botrytis
Cebolla	Allium cepa
Habichuela	Phaseolus vulgaris
Lechosa	Carica papaya
Lechuga	Lactuca sativa
Papa	Solanum tuberosum
Piña	Ananas comosus
Repollo	Brassica oleracea var. capitata
Remolacha	Beta vulgaris
Tomate	Solanum lycopersicum
Yuca	Manihot esculenta
Zanahoria	Daucus carota

DOSIS RECOMENDADA: 0.8 - 1.25 Litros/Ha.

RANGO PH DEL AGUA A UTILIZAR EN LA MEZCLA: 6.0 - 7.0

INTERVALO DE APLICACION: Por lo general se realiza una sola aplicación al inicio del cultivo y una segunda aplicación puede realizarse a los quince días.

INTERVALO ENTRE LA ULTIMA APLICACION Y LA COSECHA: 15 días para todos los cultivos.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: Espere que el rocío del producto haya secado ó 12 horas. Si fuere necesario ingresar antes, utilice equipo de protección personal: sombrero, gafas protectoras, mascarillas, overol, guantes y botas de hule.

FITOTOXICIDAD: DODINE 24 EC, no es fitotóxico para los cultivos señalados en el panfleto, a la dosis recomendada.

COMPATIBILIDAD: DODINE 24 EC, es compatible con la mayoría de fitosanitarios de uso común. No debe mezclarse con Bentazone ni con Acifluorfen.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte ni almacene juntamente con alimentos de consumo humano, animal, fertilizantes ni semillas. Almacénese y transportese en su envase original, en lugar seco y ventilado y lejos del alcance de los niños o personas mentalmente incapaces. Maneje el producto cuidadosamente para evitar derrames. Si el derrame ocurre, cúbralo con aserrín o arena y deposítelo en el centro más cercano autorizado para esos fines por el Ministerio de Agricultura.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, OVEROL, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACION DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Puede provocar, nauseas, vómitos, diarrea, irritación de las vías respiratorias, mucosidades, fatiga y dolor de cabeza.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTION: Dé a beber al intoxicado tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Si no tiene carbón activado, déle a beber clara de huevo con un poco de agua (8 para adultos, 4 para niños). Busque atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese inmediatamente las ropas contaminadas y lávese con abundante agua y jabón la parte afectada. Obtenga ayuda médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese éstos por espacio de 15 minutos con abundante agua limpia. Véase el médico.

EN CASO DE INHALACION: Traslade al paciente a un lugar no contaminado y manténgalo en reposo. Obtenga ayuda médica.

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA AL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MEDICO: No existe antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de sostén.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:
Hospital Dr. Luis E. Aybar. (Morgan).
C/ Federico Velásquez No. 1, Santo Domingo
TEL.: 809- 332-6666
Hospital Dr. Fco. Moscoso Puello.
Nicolás de Ovando No. 225, Santo Domingo
TEL.: 809- 684-7828

PROTECCION AL AMBIENTE:



TOXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS:



TOXICO PARA GANADO Y ANIMALES DOMESTICOS:

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

RESPETE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Los envases vacíos, deben pasar por un proceso de limpieza de "triple lavado" perforarlos y depositarlos en un centro de acopio autorizado por las autoridades del Ministerio de Agricultura. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, éstos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera de las plantaciones tratadas.



EL USO DE ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTIA: La compañía fabricante y el distribuidor garantizan la composición química y la calidad de este producto según las especificaciones indicadas, siempre que el mismo sea conservado en envases originales cerrados. Los ensayos y trabajos realizados siguiendo las instrucciones de esta etiqueta han demostrado ser eficiente para los usos recomendados. Debido a la imposibilidad de controlar las aplicaciones y/o almacenamiento del producto no nos responsabilizamos por daños y/o perjuicios derivados del mal uso o almacenamiento de los mismos. El consumidor adquiere el producto con pleno conocimiento de lo indicado.

EXPORTADO POR:
TRUSTCHEM CO. LTD.
D2, 23 RD FLOOR, GOLDEN
EAGLE INTERNATIONAL PLAZA,
89 HANZHONG ROAD 210029,
NANJING, CHINA.

FABRICADO POR:
**YIFAN BIOTECHNOLOGY
GROUP CO., LTD.**
NO.136 CALLE ZHONGXING, ZONA
INDUSTRIAL DE WENZHOU,
ZHEJIANG, CHINA.

Importador y Registrante:

J.A.GARCIA, S.R.L.

C/ Rafael Pérez #54, Los Tocones, El Ingenio Arriba, Santiago, República Dominicana
Tel.: 809-575-1323 1-809-200-0092 (Sin cargo) Email: info@jagarcia.com.do Website: www.jagarcia.com.do

PAIS	NO. DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
Rep. Dominicana.	5832	20 / 09 / 2017